

# 化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-05-0017	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	登録は6
レジメン名	FLAGM	総コース数	4コース
対象疾患	再発及び難反応性急性骨髄性白血病		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日	備考
				1日	回数	回					
1	フィルグラスチムBS300	300 $\mu$ g/m <sup>2</sup>		1日	1	回	皮下注		13時	day	治療開始時、24hr後、48hr後、72hr後
				1日		回				day	
				1日		回					
2	アクチット 500ml	1本		1日	2	回	点滴			day	2~6
	7%炭酸水素ナトリウム注20ml	2本		1日		回				day	
				1日		回				day	
3	グラネセロン静注バッグ1mg/50mL	1本		1日	2	回	点滴	5分	朝夕	day	2~6
		1A		1日		回				day	
				1日		回				day	
4	生食100ml	1本		1日	2	回	点滴		30分	day	G-CSF初回投与より20hr後、32hr後、44hr後、56hr後、68hr後、80hr後、92hr後、104hr後(*)
	フルダラ50mg	15mg/m <sup>2</sup>		1日		回			9時 21時	day	
(*) フルダラはAra-C投与の4時間前に投与された場合、Ara-Cの代謝活性物質であるAra-CTPの細胞内濃度を最大としAra-Cの抗白血病作用を増すことが示されている。											
5	生食100ml	1本		1日	1	回	点滴		30分	day	G-CSF初回投与より72hr後、96hr後、120hr後
	ノアントン注20mg	10mg/m <sup>2</sup>		1日		回			13時	day	
				1日		回				day	
6	生食 100ml	1本		1日	2	回	点滴	側管		day	キロサイドの前投薬
	ソルコーテフ 100mg	1V		1日		回				day	
				1日		回				day	
7	生食500ml	1本		1日	2	回	点滴		180分	day	G-CSF初回投与より24hr後、36hr後、48hr後、60hr後、72hr後、84hr後、96hr後、108hr後
	キロサイド注1g	2000mg/m <sup>2</sup>		1日		回			13時 1時	day	
				1日		回				day	