

# 化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

|          |                                |                      |     |
|----------|--------------------------------|----------------------|-----|
| レジメン登録番号 | 01-07-0039-1                   | 1コースの期間(次コースまでの標準期間) | 28日 |
| レジメン名    | JSCT-ALL2019 ph(-)地固めB(16～35歳) | 総コース数                | 2回  |
| 対象疾患     | 成人急性リンパ性白血病                    |                      |     |

| 投与順序 | 薬剤名+溶解液(液量mL)       | 1回投与量                  | 投与上限量 | 1日投与回数 |   |   | 投与方法   | ルート(主管側管など)                      | 投与時間 | 投与日 |     | 備考                           |
|------|---------------------|------------------------|-------|--------|---|---|--------|----------------------------------|------|-----|-----|------------------------------|
| 1    | ソルデム1 500ml         | 1本                     |       | 1日     | 3 | 回 | 中心静脈   | 主管                               |      | day | 1-4 |                              |
|      | 7%炭酸水素ナトリウム 20ml    | 2本                     |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 2    | 5%ブドウ糖液 50ml        | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 主管                               |      | day | 5   | ロイナーゼの<br>ルート確保              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 3    | グラニセトロンバッグ 1mg/50mL | 1バッグ                   |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 5分   | day | 1-5 |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 4    | 生食 100ml            | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 30分  | day | 2.3 |                              |
|      | ノバントロン              | 10mg/m <sup>2</sup>    |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 5    | 生食 50ml             | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 5分   | day | 1-4 | シタラビンの<br>前投薬                |
|      | ソル・コーテフ100mg        | 1本                     |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 6    | 生食 500ml            | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 3時間  | day | 1-4 |                              |
|      | シタラビン               | 2000mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 7    | 注射用水 20ml           | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 皮内注    | ★ロイナーゼ<br>皮内反応試験用<br>(不要ならRp.削除) |      | day | 5   | 皮内反応試験の<br>結果を薬剤部に<br>連絡すること |
|      | 生食 20ml             | 1本                     |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 8    | 生食 50ml             | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 5分   | day | 5   | ロイナーゼの<br>本投与前               |
|      | ソルコーテフ100           | 1本                     |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 9    | 5%ブドウ糖液 250ml       | 1本                     |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈   | 側管                               | 4時間  | day | 5   |                              |
|      | ロイナーゼ               | 10000KU/m <sup>2</sup> |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
|      |                     |                        |       | 1日     |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |
| 10   | (フィルグラスチム)          | 150 μg(皮下)             |       |        |   | 回 | 皮下or静注 |                                  |      | day | 6～  | 好中球数5000/μL<br>以上まで投与        |
|      |                     | 300 μg(静注)             |       |        |   | 回 |        |                                  |      | day |     |                              |