

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	01-11-0004-1	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	21日
レジメン名	HD-MTX/Ara-C	総コース数	4回
対象疾患	中枢神経悪性リンパ腫		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	ソルデム1 500ml	1本		1日	6	回	点滴注射	主管		day	1	
	7%炭酸水素ナトリウム 20mg	2本		1日	4	回				day	2-5	
				1日		回				day		
2	グラニセロンバッグ 1mg/50mL	1本		1日	1	回	静脈内注射	側管	5分	day	1	
				1日	2	回				day	2.3	
				1日	1	回				day	4	
3	生食 50ml	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	15分	day	1	輸液ポンプで200ml/h【全量50ml】、10時大バッグの前に
	メソトレキセート	500mg/m ²		1日		回	速度指定			day		
				1日		回	200ml/h			day		
4	生食 250ml	1本		1日	1	回	点滴注射	側管	3時間	day	1	輸液ポンプで166ml/hr【全量500ml】※生食量注意※、10時小ボトルの次に
	メソトレキセート	3000mg/m ²		1日		回	速度指定			day		
				1日		回	166ml/h			day		
5	生食 20ml	1本		1日	2	回	静脈内注射	側管		day	2.3	シタラビン前に
	ソル・メドロール 40mg	0.5V		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	生食 250ml	1本		1日	2	回	点滴注射	側管	1時間	day	2.3	9.21時
	シタラビン	2000mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	生食 20ml	5ml		1日	1	回	静脈内注射	側管		day	1	MTX終了12時間後、2時1Vを生食5mlで溶解しシリンジに全量採取したあと生食で全量20mlにして投与
	レボホリナート 25mg	1V		1日		回				day		
				1日		回				day		
8	生食 20ml	5ml		1日	3	回	静脈内注射	側管		day	2	MTX終了18時間後より6時間毎、2.8.14.20時1Vを生食5mlで溶解しシリンジに2.5ml採取したあと生食で全量10mlにして投与
	レボホリナート 25mg	0.5V		1日	4	回				day	3.4	
				1日		回				day		
9	注射用水 20ml	1本		1日	2	回	静脈内注射	側管		day	1-5	
	ダイアモックス 500mg	0.5V		1日		回				day		
				1日		回				day		