

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

レジメン登録番号	02-04-0003-2	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日
レジメン名	Bev[BS](10mg)+mFOLFOX6(外来インヒューサー)	総コース数	PDまで(登録は999回)
対象疾患	Colorectal ca.		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	グラニセトロン 1mg/50mL	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管	5分	day	1	リザーバーより
	デキサート 6.6mg	1V		1日		回				day		
				1日		回				day		
2	生食 100ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管	90分	day	1	2回目60分、 3回目以降30分 へ短縮可能
	ベバシズマブBS	10mg/kg		1日		回				day		
				1日		回				day		
3	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	5分	day	1	
				1日		回				day		
4	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	2時間	day	1	オキサリプラチンと 同時
	レボホリナート	200mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
5	5%ブドウ糖液 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	2時間	day	1	患者側近位端 より
	オキサリプラチン	85mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	5%ブドウ糖液 100ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	10分	day	1	
	フルオロウラシル	400mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	5%ブドウ糖液 100ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	10分	day	1	
				1日		回				day		
8	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射		46時間	day	1	インヒューサーポンプで 全140mlになるよう、 最低5ml必要
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		1日		回				day		
	ヘパリンナトリウム注	3ml		1日		回				day		
9	ヘパフラッシュ 10単位/mLシリンジ10mL	1本		1日	1	回	中心静脈注射			day	1	