

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

| | | | |
|----------|----------------|----------------------|------------|
| レジメン登録番号 | 02-04-0014 | 1コースの期間(次コースまでの標準期間) | 28日 |
| レジメン名 | Cetuximab | 総コース数 | 999回(PDまで) |
| 対象疾患 | Colorectal ca. | | |

| 投与順序 | 薬剤名+溶解液(液量mL) | 1回投与量 | 投与上限量 | 1日投与回数 | | | 投与方法 | ルート(主管側管など) | 投与時間 | 投与日 | 備考 | |
|------|---------------------|----------------------|-------|--------|---|---|------------|-------------|------|-----|-----------|--------------------------------|
| | | | | 1日 | 1 | 回 | | | | | | |
| 1 | レスタミン錠10mg | 5T | | 1日 | 1 | 回 | 内服 | | | day | 1.8.15.22 | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 2 | グラネセロン静注バッグ1mg/50mL | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管より | 5分 | day | 1.8.15.22 | 同時にレスタミン5錠内服 |
| | デキサート 6.6mg | 1V | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 3 | 生食 100ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管より | 30分 | day | 1.8.15.22 | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 4 | 生食 250ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射(側管より) | | 1時間 | day | 1.8.15.22 | 専用ルートより輸液ポンプでDEX,グラネセロンと30分あける |
| | アービタックス | 250mg/m ² | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 5 | 生食 100ml | 1本 | | 1日 | 1 | 回 | 点滴注射 | 主管より | 1時間 | day | 1.8.15.22 | ケモ終了後流す |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 6 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 7 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| 8 | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |
| | | | | 1日 | | 回 | | | | day | | |