

化学療法レジメン登録票

診療科: 外科

レジメン登録番号	02-04-0029	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日
レジメン名	Ram+FOLFIRI(外来インヒューザー)	総コース数	999回(PDまで)
対象疾患	治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
1	グラニセロンバッグ 1mg/50mL	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管より	5分	day	1	リザーバーより
	デキサート 6.6mg	1V		1日		回				day		
	ポララミン 5mg	1A		1日		回				day		
2	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管より		day	1	サイラムザ 前後フラッシュ
				1日		回				day		
3	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	60分	day	1	専用ルートで (サイラムザの 投与のみに使用)
	サイラムザ	8mg/kg		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
5	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	2時間	day	1	イリノテカンと同時
	レボホリナート	200mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	5分	day	1	レボホリナート終了 後のルートより
	フルオロウラシル	400mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	5分で	day	1	
				1日		回				day		
8	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管より	46時間	day	1~2	インヒューザーポンプで 全140mlになるよう、 最低5ml必要
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		1日		回				day		
	ヘパリンNa注 1万単位	3ml		1日		回				day		
9	ヘパリンNaロック用シリンジ 100単位/10ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射			day		
				1日		回				day		