

# 化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

|          |                         |                      |     |
|----------|-------------------------|----------------------|-----|
| レジメン登録番号 | 02-04-0036              | 1コースの期間(次コースまでの標準期間) | 14日 |
| レジメン名    | C-mab+FOLFIRI(外来 1コース目) | 総コース数                | 1回  |
| 対象疾患     | 進行・再発の結腸・直腸癌            |                      |     |

| 投与順序 | 薬剤名+溶解液(液量mL)            | 1回投与量                 | 投与上限量 | 1日投与回数 |   |   | 投与方法   | ルート(主管側管など) | 投与時間 | 投与日 |     | 備考                              |
|------|--------------------------|-----------------------|-------|--------|---|---|--------|-------------|------|-----|-----|---------------------------------|
| 1    | グラニセトロン 1mg/50ml         | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 主管          | 30分  | day | 1,8 | サーフローで血管確保の時もあり                 |
|      | デキササート 6.6mg             | 1V                    |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 2    | 生食 20ml                  | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          |      | day | 1,8 |                                 |
|      | ボララミン 5mg                | 1A                    |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 3    | 生食 250ml                 | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 2時間  | day | 1   | 専用ルートより輸液ポンプでDEX,グラニセトロンと30分あける |
|      | アービタックス                  | 400mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 4    | 生食 250ml                 | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 1時間  | day | 8   | 専用ルートより輸液ポンプでDEX,グラニセトロンと30分あける |
|      | アービタックス                  | 250mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 5    | 生食 50ml                  | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 主管          | 流し   | day | 1,8 |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 6    | 生食 250ml                 | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 2時間  | day | 1   |                                 |
|      | イリノテカン                   | 150mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 7    | 生食 250ml                 | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 2時間  | day | 1   | イリノテカンと同時                       |
|      | レボホリナート                  | 200mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 8    | 生食 50ml                  | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 主管          | 流し   | day | 1   |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 9    | 生食 50ml                  | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 5分   | day | 1   | レボホリナート終了後のルートより                |
|      | フルオロウラシル                 | 400mg/m <sup>2</sup>  |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 10   | 生食 20ml                  | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 側管          | 46時間 | day | 1   | インヒューザーポンプで全140mlになるよう、最低5ml必要  |
|      | フルオロウラシル                 | 2400mg/m <sup>2</sup> |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
|      | ヘパリンナトリウム注               | 3ml                   |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |
| 12   | ヘパリンロック用10単位/mLシリンジ*10mL | 1本                    |       | 1日     | 1 | 回 | 中心静脈注射 | 主管          |      | day | 1,8 | サーフロー使用時不要                      |
|      |                          |                       |       | 1日     |   | 回 |        |             |      | day |     |                                 |