

化学療法レジメン登録票

診療科: 内科

レジメン登録番号	02-04-0037	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	14日
レジメン名	C-mab+FOLFIRI(外来 2コース目～)	総コース数	PDまで(999回)
対象疾患	進行・再発の結腸・直腸癌		

投与順序	薬剤名+溶解液(液量mL)	1回投与量	投与上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管側管など)	投与時間	投与日		備考
				1日	1	回				day	1,8	
1	グラニセトロン 1mg/50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管	30分	day	1,8	サーフローで血管確保の時もあり
	デキササート 6.6mg	1V		1日		回				day		
				1日		回				day		
2	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管		day	1,8	
	ポララミン 5mg	1A		1日		回				day		
				1日		回				day		
3	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	1時間	day	1,8	専用ルートより輸液ポンプでDEX,グラニセトロンと30分あける
	アービタックス	250mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管	流し	day	1,8	
				1日		回				day		
5	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	2時間	day	1	
	イリノテカン	150mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
6	生食 250ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	2時間	day	1	イリノテカンと同時
	レボホリナート	200mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
7	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管	流し	day	1	
				1日		回				day		
8	生食 50ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	5分	day	1	レボホリナート終了後のルートより
	フルオロウラシル	400mg/m ²		1日		回				day		
				1日		回				day		
9	生食 20ml	1本		1日	1	回	中心静脈注射	側管	46時間	day	1	インヒューザーポンプで全140mlになるよう、最低5ml必要
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		1日		回				day		
	ヘパリンナトリウム注	3ml		1日		回				day		
10	ヘパリンロック用10単位/mLシリンジ10mL	1本		1日	1	回	中心静脈注射	主管		day	1,8	サーフロー使用時不要
				1日		回				day		
11				1日		回				day		
				1日		回				day		
				1日		回				day		