

化学療法レジメン登録票

診療科: 血液内科

レジメン登録番号	01-07-0030-1	1コースの期間(次コースまでの標準期間)	28日間
レジメン名	Isa-Kd 50kg未満(1コース目)	総コース数	1回(登録は999回)
対象疾患	再発又は難治性の多発性骨髄腫		

投与 順序	薬剤名＋溶解液(液量mL)	1回 投与量	投与 上限量	1日投与回数			投与方法	ルート(主管 側管など)	投与時間			備考
1	生食 50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.8.	ルート確保 洗浄用
				1日		回				day	15.22	
2	生食 50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	5分	day	1.8.	前投薬
	ネオレスタール 10mg	1A		1日		回				day	15.22	
3	アセリオ 1000mg	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	15分	day	1.8. 15.22	前投薬
	ファモチジン 20mg	1A		1日		回				day		
				1日		回				day		
4	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管	60分	day	1.8. 15.22	前投薬終了後 60分かけて投与
				1日		回						
5	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管		day	1	専用ルートで 88(～60分)→113(～90分)→138(～120分) →163(～150分)mL/hr 【全量250mL】※生食 量注意
	サークリサ	10mg/kg		1日		回						
6	生食 250mL	1本		1日	1	回	点滴静注	側管		day	8.15. 22	専用ルートで 88(～60分)→138(～90分)→188(～120分) mL/hr【全量 250mL】※生食量注意
	サークリサ	10mg/kg		1日		回						
7	5%ブドウ糖液50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.2.8.9. 15.16	流し後、カイプロリス つなぐ
8	5%ブドウ糖液100mL	day1.2		1日	1	回	点滴静注	側管	30分	day	1.2.8.9. 15.16	10mg製剤: 5mL 40mg製剤: 20mL の注射用水で溶解 ※カイプロリスの主管はブ ドウ糖のみ
	カイプロリス	20mg/m <sup>2</sup>										
	注射用水20mL	day8～ 56mg/m <sup>2</sup>										
7	5%ブドウ糖液50mL	1本		1日	1	回	点滴静注	主管		day	1.2.8.9. 15.16	カイプロリス投与後の 流し
10	レナデックス	20mg		1日	1	回	経口			day	1.2.8.9. 15.16. 22.23	年齢に応じて減量可 (75歳以下は半量へ)

