

# パキロビッド相互作用チェックシートの使い方

薬剤名: 商品名(一般名), 一般名(商品名)	薬効分類	↑併用薬増 ↓併用薬減	薬剤名: 商品名(一般名), 一般名(商品名)	薬効分類	↑併用薬増 ↓併用薬減
パキロビッド添付文書の禁忌(薬効別)			パキロビッド添付文書の禁忌(薬効別)		
パキロビッド添付文書の慎重投与(薬効別)			パキロビッド添付文書の慎重投与(薬効別)		
英 St. John's Wort, Hypericum perforatum 等の記載のある抗うつ作用などを運った健康食品(サプリメント)	健康食品(サプリメント)	パキロビッド↓	エストラジオール (エストラーナ, クルーナラル, エストロジール, テス, アプゼジ, アンメノエイド, ジュリナ, バラニン, プロキノン, テイピゲル, タイ, 女性ホルモン製剤)	女性ホルモン製剤	↓
アーリーダ(アパルタミド)			経口避妊薬		↓
アイミクス(イルベサルタン・アムロジピ アジルサルタン・アムロジピ(ザカラ ソ))			抗悪性腫瘍薬		AUC5倍超↑
アストモリジン(プロキシフィリン・エフェドリン・ フェナルピタール)	気管拡張薬	パキロビッド↓	抗菌薬		AUC3倍超↑
アゼルニジピン(カルブロック)	降圧薬	AUC5倍超↑	抗菌薬		AUC3倍超↑
アゼルニジピン・オルメサルタン(オルアゼ, レザルタス)	降圧薬	AUC5倍超↑	頭痛治療薬		↑
アタザナビル(レイアタツ)	抗HIV薬	↑	子宮収縮薬		↑
アダラート(ニフェジピン)	降圧薬	AUC3倍超↑	片頭痛治療薬		AUC5倍超↑
アデムバス(リオシグアト)	肺高血圧症治療薬	↑	抗悪性腫瘍薬		↑
アドエア(サルメテロール・フルチカゾン)	喘息治療配合剤	↑	降圧薬		↑

各薬剤を商品名と成分名  
別々に表示

ピンク背景: 禁忌

白背景: 慎重投与

赤文字: 商品名(一般名)

青文字: 成分名(商品名)

AUC3倍超

: リトナビルによって併用薬のAUCが3倍以上になると報告がある

AUC5倍超

: リトナビルによって併用薬のAUCが5倍以上になると報告がある

↑

: 併用薬の血中濃度が上昇

↓

: 併用薬の血中濃度が低下

パキロビッド↓

: パキロビッドの血中濃度が低下

## 【免責事項】

本シートは、添付文書上の禁忌および慎重投与薬を成分名と商品名を並列表記し、AUC上昇に関する情報があるものは併記をしています。なお、AUC上昇に関する情報はノービア錠(リトナビル)の添付文書を参考としています。

本シートは2022年9月26日時点の薬剤情報を反映しています。商品名については外用剤・配合剤・後発品など網羅できていないものもあるため、あくまでも参考情報としての利用に留めていただき、実際の処方については各医師の責任下で行っていただきますようお願い致します。

本シートの使用により生じた損害について、いかなる場合にも当院は一切の責任を負うものではありません。本シートに関するお問い合わせは原則受け付けておりません。以上ご承諾の上でご利用下さい。

## 【参考資料】

1)パキロビッド添付文書, 2)ノービア添付文書, 3)日本医療薬学会 パキロビッド(ニルマトレルビル/リトナビル)の薬物相互作用マネジメントの手引き-第1版-(2022.2), 4)日本医療薬学会 医療現場における薬物相互作用への関わり方ガイド