

# 末梢動脈疾患 血管内治療5日間

2019/5/24 13:43

バス日数 5日間	適応基準	除外条件	目標
	症状のある末梢動脈疾患。	安静が守れない。感染コントロール不良。造影剤アレルギー。	合併症なく退院できる。

日付 ユニット名		第1病日 治療前日	第2病日		第3病日	第4病日	第5病日	
		治療前	治療後	治療翌日	治療後第2病日	治療後第3病日	治療後第4病日	
アウトカム	患者状態	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	
	知識・教育	治療について理解できる			退院後の生活管理について理解できる	退院後の生活管理について理解できる		
サマリ文書		ベッドネーム						
		栄養スクリーニング						
		褥瘡予防対策診療計画書						
		転倒・転落アセスメントシート						
		身体抑制(拘束)指示書・観察チェックシート						
		身体抑制に関する説明書・同意書						
		ポンプ類チェック表						
		おむつ請求伝票						
		処置材料請求伝票						
		血管造影前チェックリスト						
		看護計画書(病棟用)						
		入院診療計画書(下肢閉塞性動脈硬化症) H28						
血管内治療説明と同意書								
造影検査同意書								
治療	注射	[F]ソリュージェン注 500[500mL/本](ウイーンF) 1本	[F]ソリュージェン注500[500mL/本](ウイーンF) 1本					
		[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1パック	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック) 1シリンジ	[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1パック				
	汎用	安静度:院内フリー	貴重品・化粧品など除去	患者区分(移動):ストレッチャー	安静度:病棟内フリー	安静度:院内フリー	清潔:シャワー浴可	安静度:院内フリー
		清潔:シャワー浴可	安静度:病棟内フリー	固定:ニープレス	8時沈子除去後、モニター、バルン抜去	清潔:シャワー浴可		
		同意書確認	バルン挿入	帰室後5時間後にニープレス除去	清潔:シャワー浴可			
		足背動脈マーキング	同意書確認	排泄:ベッド上	心電図モニター			
				帰室後飲水可				
				ニープレス除去後ベッド上フリー				
				尿測				
				心電図モニター				
血液検査 他								
ABI SPP								
検査	検体検査		血管内治療					
	画像・生理							
	睡眠	睡眠状態 毎日1回		睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	
	与薬の援助	内服確認 毎日1回	内服確認 毎日1回	内服確認 毎日2回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	
	バイタル	体温(°C) 毎日2回	体温(°C) 毎日2回	体温(°C) 毎日4回	体温(°C) 毎日3回	体温(°C) 毎日3回	体温(°C) 毎日3回	
		脈拍数 毎日2回	脈拍数 毎日2回	脈拍数 毎日4回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	
		収縮期血圧 毎日2回	収縮期血圧 毎日2回	収縮期血圧 毎日4回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	
		拡張期血圧 毎日2回	拡張期血圧 毎日2回	拡張期血圧 毎日4回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	
		呼吸数 毎日2回	呼吸数 毎日2回	呼吸数 毎日4回	呼吸数 毎日3回	呼吸数 毎日3回	呼吸数 毎日3回	
		食事摂取量(主) 毎日1回	食事摂取量(主) 毎日1回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日3回	食事摂取量(主) 毎日3回	食事摂取量(主) 毎日3回	
	食事摂取量(副) 毎日1回	食事摂取量(副) 毎日1回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日3回	食事摂取量(副) 毎日3回	食事摂取量(副) 毎日3回		
	ケア	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回		排尿回数 毎日2回			
		身長(cm) 毎日1回			排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	
		体重(kg) 毎日1回						
	測定	SPO2 毎日2回	SPO2 毎日2回	SPO2 毎日4回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	
OUT			尿量 毎日2回	尿量 毎日2回				
看護ケア	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日3回	呼吸困難感 毎日3回	呼吸困難感 毎日3回	呼吸困難感 毎日3回		
	右橈骨動脈触知 毎日1回	右橈骨動脈触知 毎日1回	右橈骨動脈触知 毎日2回	右橈骨動脈触知 毎日2回	右橈骨動脈触知 毎日1回	右橈骨動脈触知 毎日1回		
	左橈骨動脈触知 毎日1回	左橈骨動脈触知 毎日1回	左橈骨動脈触知 毎日2回	左橈骨動脈触知 毎日2回	左橈骨動脈触知 毎日1回	左橈骨動脈触知 毎日1回		
	右足背動脈触知 毎日1回	右足背動脈触知 毎日1回	右足背動脈触知 毎日2回	右足背動脈触知 毎日2回	右足背動脈触知 毎日1回	右足背動脈触知 毎日1回		
	左足背動脈触知 毎日1回	左足背動脈触知 毎日1回	左足背動脈触知 毎日2回	左足背動脈触知 毎日2回	左足背動脈触知 毎日1回	左足背動脈触知 毎日1回		
	全身倦怠感 毎日1回	全身倦怠感 毎日1回	全身倦怠感 毎日1回	全身倦怠感 毎日1回	全身倦怠感 毎日1回	全身倦怠感 毎日1回		
	気分不快 毎日1回	気分不快 毎日1回	気分不快 毎日3回	気分不快 毎日3回	気分不快 毎日3回	気分不快 毎日3回		
			穿刺部痛 毎日3回	穿刺部痛 毎日3回	穿刺部痛 毎日3回	穿刺部痛 毎日3回		
			創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回		
			穿刺部出血 毎日3回	穿刺部出血 毎日3回	穿刺部出血 毎日3回	穿刺部出血 毎日3回		
			穿刺部腫脹 毎日3回	穿刺部腫脹 毎日3回	穿刺部腫脹 毎日3回	穿刺部腫脹 毎日3回		
	病床環境整備	環境整備 毎日1回	環境整備 毎日1回		環境整備 毎日1回	環境整備 毎日1回		
	指導					退院指導 毎日1回		
	説明	入院時オリエンテーション 毎日1回						
感染	標準予防策 毎日1回	標準予防策 毎日1回		標準予防策 毎日1回	標準予防策 毎日1回			
サイン	サイン 毎日3回	サイン 毎日3回		サイン 毎日3回	サイン 毎日3回			
必要時	熱が38度以上になった場合			カロナール錠200 2錠				
	不穏が有る場合			アセチルサリチル酸注バッグ[1000mg/100mL] 0.5 V				
				◇液1mL包】リスヘリトン液(リスハダール) 1本				
				◇アタラックス-P注25[25mg/1mL] 1 A				
				生理食塩液[100mL/PB] 1本				
				◇ハロペリドール注5[5mg/1mL](リントン)(セレネース) 1 A				
				ロゼレム錠8mg 1錠				
不眠の有る場合			(5)ゾレピテム錠5mg(マイスリー) 1錠					
疼痛全般			(向)ソセコン注15[15mg/1mL] 0.5 A					
			カロナール錠200 2錠					
吐き気または気分不良時			メクログラミド注10[10mg/2mL](グリンヘラン) 1 A					
低血糖時70以下の時			50%ブドウ糖20[50%/20mL] 2本					
便秘の場合			ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラキソベロン) 1本					
			酸化マグネシウム錠330mg(マグミット) 2錠					
			センゾット錠12mg(フルセノド) 2錠					