

ペースメーカー新規植込み術

パス日数 10日間	適応基準	除外条件	目標
	徐脈性不整脈 ガイドラインで植込み基準がclass I、II A	安静が守れない	ペースメーカーが正常に作動し、合併症がない

日付		第1病日	第2病日		第3病日	第4病日	第5病日	第6病日	第7病日	第8病日	第9病日	第10病日	
ユニット名		植込み前日	術前	術後	術翌日	術後2日目	術後3日目	術後4日目	術後5日目	術後6日目	術後7日目	術後8日目	
アウトカム	患者状態		循環動態が安定している	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	循環動態が安定している 創部に問題がない	
	知識・教育	手術に対し理解・同意できる										退院後の生活管理について理解できる	
サマリ文書		入院診療計画書(B様式)											
		ペースメーカー植込み交換同意書 2版											
		ベッドネーム											
		栄養スクリーニング											
		褥瘡予防対策診療計画書											
		転倒・転落アセスメントシート 血管造影前チェックリスト 看護計画書(ペースメーカー)											
治療	注射		[F]リユージェンF注500[500mL/本](ゲインF) 1本	[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1バック	[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1バック								
			[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1バック	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ								
			補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	[F]リユージェンF注500[500mL/本](ゲインF) 1本									
	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター	安静度:病棟内フリー
		水分は術前2時間前まで可	点滴終了後ロック	病棟内フリー	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上90°まで	上肢挙上制限解除	排泄:トイレ歩行可
	汎用	セファゾリンは術前1時間前から30分で投与	植込み側の左腕上は90°まで	検脈の指導	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	安静度:病棟内フリー	清潔:シャワー浴可
	貴重品・化粧品など除去	安静度:ベッドフリー	排泄:ポータルトイレ可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	清潔:シャワー浴可	
	バルンカテーテル留置	清潔:介助清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	清潔:自力清拭	ペースメーカーチェック	
		尿測	尿測	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	尿測:不要	身体障害者申請	
		尿測	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去	9時バルン抜去		
		帰室後2時間は安静臥床	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了	抗生剤終了		
		酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻	酸素吸入:経鼻		
	リハ												
検査	検体検査												
	画像・生理	胸部 2方向(正面・L側面)	ペースメーカー移植術	胸部 正面(臥位)	胸部 2方向(正面・L側面)							胸部 2方向(正面・L側面)	
看護ケア	睡眠	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	睡眠状態 毎日1回	
	与薬の援助	内服確認 毎日2回	内服確認 毎日2回	内服確認 毎日1回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	内服確認 毎日3回	
	バイタル	体温(℃) 毎日2回	体温(℃) 毎日2回	体温(℃) 毎日5回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日3回	体温(℃) 毎日2回
		脈拍数 毎日2回	脈拍数 毎日2回	脈拍数 毎日5回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日3回	脈拍数 毎日2回
		収縮期血圧 毎日2回	収縮期血圧 毎日2回	収縮期血圧 毎日5回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日3回	収縮期血圧 毎日2回
		拡張期血圧 毎日2回	拡張期血圧 毎日2回	拡張期血圧 毎日5回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日3回	拡張期血圧 毎日2回
		食事摂取量(主) 毎日1回	食事摂取量(主) 毎日1回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回	食事摂取量(主) 毎日2回
		食事摂取量(副) 毎日1回	食事摂取量(副) 毎日1回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回	食事摂取量(副) 毎日2回
	ケア	排便回数 毎日2回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回	排便回数 毎日1回
		身長(cm) 毎日1回											
		体重(kg) 毎日1回											
	測定	SPO2 毎日2回	SPO2 毎日2回	SPO2 毎日5回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	SPO2 毎日3回	
	OUT		尿量 毎日1回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回	尿量 毎日2回
	観察	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日5回	呼吸困難感 毎日3回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回	呼吸困難感 毎日1回
		動悸 毎日2回	動悸 毎日2回	動悸 毎日5回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日3回	動悸 毎日2回
		創部痛 毎日2回	創部痛 毎日2回	創部痛 毎日2回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日3回	創部痛 毎日2回
浸出液 毎日2回		浸出液 毎日2回	浸出液 毎日2回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日3回	浸出液 毎日2回	
創部腫脹 毎日2回		創部腫脹 毎日2回	創部腫脹 毎日2回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日3回	創部腫脹 毎日2回	
創部発赤 毎日2回		創部発赤 毎日2回	創部発赤 毎日2回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日3回	創部発赤 毎日2回	
指導			痺れ 毎日2回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日3回	痺れ 毎日2回	
			出血 毎日2回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日3回	出血 毎日2回	
説明	入院時オリエンテーション 毎日1回												
	術前オリエンテーション 毎日1回												
感染	標準感染予防策 毎日2回	標準感染予防策 毎日2回	標準感染予防策 毎日1回									標準感染予防策 毎日3回	
サイン	サイン 毎日2回	サイン 毎日2回	サイン 毎日1回									サイン 毎日3回	
疼痛全般	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1錠	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1錠	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1錠	ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1錠								ロキソプロフェン錠60mg(ロキソニン) 1錠	
	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠								カロナール錠200 2錠	
便秘の場合	【60】グリセリン洗腸液50% 60mL 1個	【60】グリセリン洗腸液50% 60mL 1個	【60】グリセリン洗腸液50% 60mL 1個	【60】グリセリン洗腸液50% 60mL 1個								【60】グリセリン洗腸液50% 60mL 1個	
	ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラクソバロン) 1本	ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラクソバロン) 1本	ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラクソバロン) 1本	ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラクソバロン) 1本								ピコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラクソバロン) 1本	
必要時	センバト錠12mg(プルゼニド) 2錠	センバト錠12mg(プルゼニド) 2錠	センバト錠12mg(プルゼニド) 2錠	センバト錠12mg(プルゼニド) 2錠								センバト錠12mg(プルゼニド) 2錠	
	吐き気または気分不良時	メクログラミド注 10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A	メクログラミド注 10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A	メクログラミド注 10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A								メクログラミド注 10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A	
継続指示	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ								補)ハパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ハパリンロック) 1 シリンジ	
不眠の有る場合	【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠	【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠	【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠	【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠								【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠	
	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠								プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	