

胃ESD(検査前日から)

2023/5/15 16:07

バス日数 6日間	適応基準	除外条件	目標
	ESD適応病変、ESD拡大適応病変、全身状態良好	全身状態不良【中止基準】有害事象が起こる	合併症無く治療完遂

日付 ユニット名		第1病日 入院日	第2病日 ESD1日目	第3病日 ESD2日目	第4病日 ESD3日目	第5病日 ESD4日目	第6病日 ESD5日目
アウトカム	患者状態	消化管の症状・所見がない					
		循環動態が安定している					
		疼痛がない					
	生活動作						
	知識・教育	治療について理解できる					◆退院後の生活管理について理解できる
サマリ文書		損傷予防対策診療計画書					
		転倒・転落アセスメントシート(H2408)					
		栄養スクリーニング					
		せん妄スクリーニングシート					
		ベッドネーム					

治療	処方	レミヒド錠100mg(ムコスタ)					
		ラベグラゾール錠10mg(ハリエット)(薬価:24.5円/錠)					
	注射	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]			
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]			
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]			
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]			
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]			
		(向)サイレス注 2[2mg/1mL](緊急用)					
		生理食塩液[100mL/PB]					
		(向)ソセコン注15[15mg/1mL]					
		[1]リルテム1輸液[500mL/袋](ツリタT1)					
		[50]フボホフォル注 1%[500mg/50mL](テイグリン)					
		[F]リナセートF輸液[500mL/袋](ウイーンF)					
		[F]リナセートF輸液[500mL/袋](ウイーンF)					
		オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)	オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)	オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)			
		オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)	オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)	オメプラゾール注20mg(オメプラー ル)			

検査	検体検査	全血	全血	全血		全血	
		血清		血清		血清	
		全血					

処置	内視鏡			【検査】食道・胃(一般)			
	SPO2		SPO2	SPO2	SPO2	SPO2	SPO2
	心電図モニター		心電図モニター	心電図モニター			
	末梢静脈カテーテル挿入		末梢静脈カテーテル挿入				
	末梢静脈カテーテル抜去		末梢静脈カテーテル抜去				

栄養	朝		欠食		易消化食三分	易消化食七分	易消化食軟菜
	昼		欠食		易消化食三分	易消化食軟菜	易消化食軟菜
	夜	易消化食軟菜	欠食	流動食	易消化食七分	易消化食軟菜	易消化食軟菜

看護ケア	バイタル	睡眠状態 毎日 1回					
		体温(℃) 毎日 3回					
		脈拍数 毎日 3回					
		収縮期血圧 毎日 3回					
		拡張期血圧 毎日 3回					
		呼吸数 毎日 1回					
		食事摂取量(主) 毎日 3回					
		食事摂取量(副) 毎日 3回					
	ケア	身長(cm) 毎日 1回					
		体重(kg) 毎日 1回					
		清潔ケア シャワー浴 毎日 1回					
		循環ケア 血栓の予防:弾性ストッキングの使用 毎日 1回					
		安全ケア 転落防止ケア:ベッド柵確認 毎日 1回					
		安全ケア 患者識別バンド装着の確認 毎日 1回					
		損傷予防ケア:体圧分散寝具の使用 毎日 1回					
		苦痛の予防・軽減ケア:疼痛緩和 毎日 1回					
	観察	SPO2 毎日 3回					
		嘔気(ー) 毎日 3回					
		嘔吐(ー) 毎日 3回					
		吐血(ー) 毎日 3回					
		下血(ー) 毎日 3回					
		意識評価(JCS) 毎日 3回					
		疼痛程度(NRS) 毎日 3回					
		酸素投与量 毎日 3回					
病床環境調整	指導	留置時管理:輸液ルート 毎日 3回					
		びらん(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回					
		皮膚潰瘍(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回					
		搔痒感(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回					
	説明	病棟・室内環境ケア 毎日 3回					
		生活指導:退院後の生活に対する指導 毎日 1回					
		食事指導:栄養と適正な食品・量 毎日 1回					
		入院時オリエンテーション 毎日 1回					
		内視鏡検査・治療オリエンテーション 毎日 1回					
		入院治療計画書の説明 毎日 1回					

必要時	感染	標準感染予防策 毎日 3回					
	熱が38度以上になった場合	カロナール錠200 2錠					
	血圧が90mmHgより下降した場合	リナセートF輸液[500mL/本](ウイーンF) 1A					
	不眠のある場合	◇トラゾドン錠25mg(レスリン) 1錠					
		ペルソムラ錠15mg 1錠					
	不穏が有る場合	ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠					
		◇トラゾドン錠25mg(レスリン) 1錠					
	吐き気または気分不良時	液0.5mL包]リスベリドン液(リスバダール) 1本					
		液1mL包]リスベリドン液(リスバダール) 1本					
	便秘の場合	外カワラシト注10[10mg/2mL](ワリヘラン) 1A					
		50%ドク糖20[50%/20mL] 2本					
		センシト錠12mg(ウルゼスト) 2錠					
		【60】クサリン洗腸液50% 60mL 1個					
疼痛全般	SPO2が92%以下に低下した場合	ヒコスルファート内用液0.75% 10mL/本(タリソレド) 1本					
		酸化マグネシウム錠330mg 1錠					
		新レシカルボン坐剤 1個					
		カロナール錠200 2錠					
ヘパリンロック時	生食ロック時	酸素2L/分を開始。1L/分ずつup。max10L/分。					
		ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1シリンジ					
		生理食塩液[20mL/PA] 1本					