

胃ESD(検査当日から)

2023/5/22 10:08

パス日数 5日間	適応基準 ESD適応病変、ESD拡大適応病変、全身状態良好	除外条件 全身状態不良【中止基準】有害事象が起こる	目標 合併症無く治療完了
----------	----------------------------------	------------------------------	-----------------

日付 ユニット名		第1病日 ESD1日目	第2病日 ESD2日目	第3病日 ESD3日目	第4病日 ESD4日目	第5病日 ESD5日目
アウトカム	患者状態	消化管の症状・所見がない 循環動態が安定している 疼痛がない				
	生活動作					
	知識・教育	治療について理解できる				
サマリ文書	褥瘡予防対策診療計画書					
	転倒・転落アセスメントシート (H2408)					
	栄養スクリーニング せん妄スクリーニングシート ベッドネーム					
治療	処方	レバミピド錠100mg(ムコスタ)			ラベグラゾール錠10mg(ハリエト)(薬価:24.5円/錠)	
	注射	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]
		生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]	生理食塩液[20mL/PA]
		(向)サイレース注2[2mg/1mL](緊急用)				
		[F]リナゼトF輸液[500mL/袋](ウイーンF)				
		[F]リナゼトF輸液[500mL/袋](ウイーンF)				
		[1]リルデム1輸液[500mL/袋](リリタ1)				
生理食塩液[100mL/PB] [50]アロホール注 1%[500mg/50mL](テクトリハン) (向)リセコン注15[15mg/1mL]						
	[3A]リルデム3A輸液[500mL/袋](リリタ3)	[3A]リルデム3A輸液[500mL/袋](リリタ3)				
	シーバラ注[2mL/A](VB12 非含有)					
	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ 10mL(ヘパリンロック)				
検査	検体検査	全血 血清 全血 全血	全血 血清		全血 血清	
	内視鏡		【検査】食道・胃(一般)			
	SPO2	SPO2	SPO2	SPO2	SPO2	
	心電図モニター	心電図モニター	心電図モニター			
処置	末梢静脈カテーテル挿入	末梢静脈カテーテル挿入				
	末梢静脈カテーテル抜去	末梢静脈カテーテル抜去				
	朝		欠食	易消化食三分	易消化食七分	易消化食軟菜
栄養	昼	欠食	流動食	易消化食三分	易消化食軟菜	易消化食軟菜
	夜	欠食	流動食	易消化食七分	易消化食軟菜	易消化食軟菜
	睡眠			睡眠状態 毎日 1回 体温(℃) 毎日 3回 脈拍数 毎日 3回 収縮期血圧 毎日 3回 拡張期血圧 毎日 3回 呼吸数 毎日 1回 食事摂取量(主) 毎日 3回 食事摂取量(副) 毎日 3回 排便回数 毎日 1回		
看護ケア	バイタル					
	ケア	身長(cm) 毎日 1回 体重(kg) 毎日 1回				
		清潔ケア シャワー浴 毎日 1回 循環ケア 血栓の予防:弾性ストッキングの使用 毎日 1回 安全ケア 転落防止ケア:ベット確認 毎日 1回				
		安全ケア 患者識別バンド装着の確認 毎日 1回 褥瘡予防ケア:体圧分散器具の使用 毎日 1回				
		苦痛の予防・軽減ケア:疼痛緩和 毎日 1回 SPO2 毎日 3回 嘔気(-) 毎日 3回 嘔吐(-) 毎日 3回 吐血(-) 毎日 3回 下血(-) 毎日 3回				
	観察	意識評価(JCS) 毎日 3回 酸素投与量 毎日 3回 留置時管理:輸液ルート 毎日 3回				
	病床環境調整	ひざん(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回 皮膚潰瘍(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回 掻痒感(弾性ストッキング装着部) 毎日 1回				
	指導	病床・室内環境ケア 毎日 3回 生活指導:退院後の生活に対する指導 毎日 1回 食事指導:栄養と適正な食品・量 毎日 1回				
	説明	入院時オリエンテーション 毎日 1回 内視鏡検査・治療オリエンテーション 毎日 1回 入院治療計画書の説明 毎日 1回				
	必要時	感染 熱が38度以上になった場合 血圧が90mmHgより下降した場合			標準感染予防策 毎日 3回 カロナール錠200 2錠 リナゼトF輸液[500mL/本](ウイーンF) 1A ◇トラゾド錠25mg(レスリン) 1錠 ペルソムラ錠15mg 1錠 ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠 ◇トラゾド錠25mg(レスリン) 1錠 液0.5mL(包)リスベリドン液(リスバール) 1本 液1mL(包)リスベリドン液(リスバール) 1本 オクドラト注10[10mg/2mL](クインラソ) 1A 50%ブドウ糖20[50%/20mL] 2本 ゼノト錠12mg(ケルセト) 2錠 【60】グリセリン浣腸液50% 60mL 1個 ヒコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ケキペロ) 1本 酸化マグネシウム錠330mg 1錠 新レシカルボン坐剤 1個 カロナール錠200 2錠	
	不眠のある場合					
	不穏がある場合					
	吐き気または気分不良時 低血糖70mg/dlあるいは低血糖症状があるとき					
	便秘の場合					
	疼痛全般					
	SPO2が92%以下に低下した場合					
	ヘパリンロック時					
	生食ロック時					