

冠動脈造影検査3日間上肢用

2019/5/24 13:42

パス日数 3日間	適応基準	除外条件	目標
	冠動脈狭窄の疑い	安静が守れない、高度腎機能障害、心不全急性期、造影剤アレルギー	合併症なく退院出来る

		1病日	2病日		3病日
ユニット名		検査前日	検査前	検査後	検査後
アウトカム	患者状態			循環動態が安定している 穿刺部に問題がない	穿刺部に問題がない 循環動態が安定している
	知識・教育	検査について理解できる			退院後の生活管理について理解できる
サマリ文書		造影検査同意書			
		ベッドネーム			
		栄養スクリーニング			
		褥瘡予防対策診療計画			
		転倒・転落アセスメントシート			
		栄養指導指示箋			
		血管造影前チェックリスト			
		看護計画書(カテーテル検査)			
		入院診療計画書(CAG)			
治療	注射		[F]ソリュ-ゲンF注500[500mL/本](グ-インF) 1 本	[F]ソリュ-ゲンF注500[500mL/本](グ-インF) 1 本	
				補)ヘパフラッシュ(ヘパリンロック)10単位/mLシリンジ10mL 1 シリンジ	
	汎用	清潔:シャ-浴可	術前1時間前から絶飲	検査終了1時間後からトイレ歩行可	清潔:シャ-浴可
		安静度:院内フリー	安静度:院内フリー	フリー指示	フリー指示
		入院時からカテ終了後まではコーヒー禁	貴重品・化粧など除去	TRバンド減圧時出血腫脹があった場合は元の量のAIRを入れて主治医call	フリー指示
				カテ終了1時間後より食事可	安静度:院内フリー
検査	画像・生理		冠動脈造影検査		
栄養	朝		欠食		心臓食
	昼			心臓食	
	夜			心臓食	
患者状態	睡眠	睡眠状態 毎日 1回	睡眠状態 毎日 1回		睡眠状態 毎日 1回
+ 看護ケア	与薬の援助	内服確認 毎日 2回	内服確認 毎日 2回	内服確認 毎日 1回	内服確認 毎日 2回
	バイタル	体温(℃) 毎日 2回	体温(℃) 毎日 2回	体温(℃) 毎日 4回	体温(℃) 毎日 2回
		脈拍数 毎日 2回	脈拍数 毎日 2回	脈拍数 毎日 4回	脈拍数 毎日 2回
		収縮期血圧 毎日 2回	収縮期血圧 毎日 2回	収縮期血圧 毎日 4回	収縮期血圧 毎日 2回
		拡張期血圧 毎日 2回	拡張期血圧 毎日 2回	拡張期血圧 毎日 4回	拡張期血圧 毎日 2回
		食事摂取量(主) 毎日 1回	食事摂取量(主) 毎日 1回	食事摂取量(主) 毎日 2回	食事摂取量(主) 毎日 2回
		食事摂取量(副) 毎日 1回	食事摂取量(副) 毎日 1回	食事摂取量(副) 毎日 2回	食事摂取量(副) 毎日 2回
	ケア	排便回数 毎日 1回		排便回数 毎日 1回	排便回数 毎日 1回
		身長(cm) 毎日 1回			
		体重(kg) 毎日 1回			
	測定	前腕末梢径 毎日 1回			
		SPO2 毎日 2回	SPO2 毎日 2回	SPO2 毎日 4回	SPO2 毎日 2回
	観察	疼痛(胸部) 毎日 1回	疼痛(胸部) 毎日 1回	疼痛(胸部) 毎日 4回	疼痛(胸部) 毎日 2回
		呼吸困難感 毎日 1回	呼吸困難感 毎日 1回	呼吸困難感 毎日 4回	呼吸困難感 毎日 2回
		動悸 毎日 1回	動悸 毎日 1回	動悸 毎日 4回	動悸 毎日 2回
		右橈骨動脈触知 毎日 2回		穿刺部痛 毎日 4回	穿刺部痛 毎日 2回
		左橈骨動脈触知 毎日 2回		右橈骨動脈触知 毎日 2回	右橈骨動脈触知 毎日 2回
				左橈骨動脈触知 毎日 2回	左橈骨動脈触知 毎日 2回
				自尿 毎日 1回	
				穿刺部出血 毎日 4回	穿刺部出血 毎日 2回
				穿刺部腫脹 毎日 4回	穿刺部腫脹 毎日 2回
	指導				服薬指導 毎日 1回 退院指導 毎日 1回
	説明	入院時オリエンテーション 毎日 1回			
		検査・処置オリエンテーション 毎日 1回			
	感染	標準感染予防策 毎日 2回	標準感染予防策 毎日 2回	標準感染予防策 毎日 1回	標準感染予防策 毎日 2回
	サイン	サイン 毎日 2回	サイン 毎日 2回	サイン 毎日 1回	サイン 毎日 2回
必要時指示	便秘の場合	センノシト錠12mg(フルゼニト) 2 錠		センノシト錠12mg(フルゼニト) 2 錠	センノシト錠12mg(フルゼニト) 2 錠
			センノシト錠12mg(フルゼニト) 2 錠		
	疼痛全般	カロナール錠200 2 錠		カロナール錠200 2 錠	カロナール錠200 2 錠
			カロナール錠200 2 錠		
	吐き気または気分不良時	メクログラミド注10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A	メクログラミド注10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A		メクログラミド注10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A
				メクログラミド注10[10mg/2mL](プリンペラン) 1 A	
	胸痛が有る場合	ニトロヘン舌下錠0.3mg(分割不可) 1 錠	フリー指示	ニトロヘン舌下錠0.3mg(分割不可) 1 錠	ニトロヘン舌下錠0.3mg(分割不可) 1 錠
		フリー指示	ニトロヘン舌下錠0.3mg(分割不可) 1 錠		フリー指示