

冠動脈形成術4日間上肢用

2019/5/24 13:43

バス日数 4日間	適応基準	除外条件	目標
	治療適応な冠動脈の高度狭窄病変がある	安静が守れない、高度腎機能障害、造影剤アレルギー	合併症なく退院出来る

日付		第1病日	第2病日		第3病日	第4病日
ユニット名		治療前日	治療前	治療後	治療翌日	治療後第2病日
アウトカム	患者状態	不安なく治療が受けられる		循環動態が安定している 穿刺部に問題がない	循環動態が安定している 穿刺部に問題がない	循環動態が安定している 穿刺部に問題がない
	知識・教育					退院後の生活管理について 理解できる
サマリ文書		造影検査同意書				
		ベッドネーム				
		栄養スクリーニング				
		褥瘡予防対策診療計画書				
		転倒・転落アセスメントシート				
		栄養指導指示箋				
		血管造影前チェックリスト				
		看護計画書(カテテル検査)				
		入院診療計画書(PCI)				
		経皮的冠動脈形成術同意書 2版				
治療	注射		[F]リユージェンF注 500[500mL/本](ウイーンF) 1本	[F]リユージェンF注500[500mL/ 本](ウイーンF) 1本		
				補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1 シリンジ		
	汎用	安静度:院内フリー 清潔:シャワー浴可	安静度:院内フリー 静脈内留置針挿入	安静度:病棟内フリー 心電図モニター	安静度:病棟内フリー 静脈内留置針抜去	安静度:院内フリー 排泄:トイレ歩行可
		排泄:トイレ歩行可	排泄:トイレ歩行可	治療後終了1時間後から トイレ歩行可	TRバンド除去後、主治医 確認してルート抜去	清潔:シャワー浴可
		入院時からカテ終了後までは コーヒー禁	貴重品・化粧など除去	TRバンド減圧時出血腫脹が あった場合は元の量のAIRを 入れて主治医call	排泄:トイレ歩行可	
				カテ終了1時間後より食事可	清潔:シャワー浴可	
	リハ				心大血管 I 理学	
検査	検体検査				血液検査 他	
	画像・生理		冠動脈形成術		標準12誘導心電図	
栄養	朝		欠食		心臓食	心臓食
	昼				心臓食	
	夜				心臓食	
患者状態	睡眠	睡眠状態 毎日 1回		睡眠状態 毎日 1回	睡眠状態 毎日 1回	睡眠状態 毎日 1回
看護ケア	与薬の援助	内服確認 毎日 2回	内服確認 毎日 2回	内服確認 毎日 1回	内服確認 毎日 3回	内服確認 毎日 2回
	バイタル	体温(℃) 毎日 2回	体温(℃) 毎日 2回	体温(℃) 毎日 5回	体温(℃) 毎日 3回	体温(℃) 毎日 2回
		脈拍数 毎日 2回	脈拍数 毎日 2回	脈拍数 毎日 5回	脈拍数 毎日 3回	脈拍数 毎日 2回
		収縮期血圧 毎日 2回	収縮期血圧 毎日 2回	収縮期血圧 毎日 5回	収縮期血圧 毎日 3回	収縮期血圧 毎日 2回
		拡張期血圧 毎日 2回	拡張期血圧 毎日 2回	拡張期血圧 毎日 5回	拡張期血圧 毎日 3回	拡張期血圧 毎日 2回
		呼吸数 毎日 1回	呼吸数 毎日 1回	呼吸数 毎日 5回	呼吸数 毎日 3回	呼吸数 毎日 2回
		食事摂取量(主) 毎日 1回	食事摂取量(主) 毎日 1回	食事摂取量(主) 毎日 2回	食事摂取量(主) 毎日 3回	食事摂取量(主) 毎日 2回
		食事摂取量(副) 毎日 1回	食事摂取量(副) 毎日 1回	食事摂取量(副) 毎日 2回	食事摂取量(副) 毎日 3回	食事摂取量(副) 毎日 2回
		排便回数 毎日 1回	排便回数 毎日 1回	排便回数 毎日 1回	排便回数 毎日 1回	排便回数 毎日 1回
	ケア	身長(cm) 毎日 1回				
		体重(kg) 毎日 1回				
		前腕末梢径 毎日 1回				
	測定	SPO2 毎日 2回	SPO2 毎日 2回	SPO2 毎日 5回	SPO2 毎日 3回	SPO2 毎日 2回
		疼痛(胸部) 毎日 1回	疼痛(胸部) 毎日 1回	疼痛(胸部) 毎日 5回	疼痛(胸部) 毎日 3回	疼痛(胸部) 毎日 2回
	観察	呼吸困難感 毎日 1回	呼吸困難感 毎日 1回	呼吸困難感 毎日 5回	呼吸困難感 毎日 3回	呼吸困難感 毎日 2回
		動悸 毎日 1回	動悸 毎日 1回	動悸 毎日 5回	動悸 毎日 3回	動悸 毎日 2回
		右橈骨動脈触知 毎日 1回	右橈骨動脈触知 毎日 1回	右橈骨動脈触知 毎日 4回	右橈骨動脈触知 毎日 3回	右橈骨動脈触知 毎日 2回
		左橈骨動脈触知 毎日 1回	左橈骨動脈触知 毎日 1回	左橈骨動脈触知 毎日 4回	左橈骨動脈触知 毎日 3回	左橈骨動脈触知 毎日 2回
				穿刺部痛 毎日 5回	穿刺部痛 毎日 3回	穿刺部痛 毎日 2回
				自尿 毎日 2回	自尿 毎日 2回	
				穿刺部出血 毎日 5回	穿刺部出血 毎日 3回	穿刺部出血 毎日 2回
				穿刺部腫脹 毎日 5回	穿刺部腫脹 毎日 3回	穿刺部腫脹 毎日 2回
						服薬指導 1回
						退院指導 1回
	指導	栄養指導1回				
	説明	入院時オリエンテーション 毎日 1回				
		術前オリエンテーション 毎日 1回				
	感染	標準感染予防策 毎日 2回	標準感染予防策 毎日 2回	標準感染予防策 毎日 1回	標準感染予防策 毎日 3回	標準感染予防策 毎日 2回
	サイン	サイン 毎日 2回	サイン 毎日 2回	サイン 毎日 1回	サイン 毎日 3回	サイン 毎日 2回
必要時	熱が38度以上になった場合	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	
	不眠の有る場合	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	プロチゾラム錠0.25mg(レンドルミン) 1錠	
		【5mg】マイスリー錠 5mg 1錠	【5mg】マイスリー錠 5mg 1錠	【5mg】マイスリー錠 5mg 1錠	【5mg】マイスリー錠 5mg 1錠	
	吐き気または気分不良時	メクロプラミド注 10[10mg/2mL](フリンペラン) 1 A	メクロプラミド注 10[10mg/2mL](フリンペラン) 1 A	メクロプラミド注 10[10mg/2mL](フリンペラン) 1 A	メクロプラミド注10[10mg/2mL](フリンペラン) 1 A	
	疼痛全般	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	カロナール錠200 2錠	
	胸痛が有る場合	ニトロペン舌下錠0.3mg(分割不可) 1錠	ニトロペン舌下錠0.3mg(分割不可) 1錠	ニトロペン舌下錠0.3mg(分割不可) 1錠	ニトロペン舌下錠0.3mg(分割不可) 1錠	
	便秘の場合	プルゼニド錠12mg 2錠	プルゼニド錠12mg 2錠	プルゼニド錠12mg 2錠	プルゼニド錠12mg 2錠	
	継続指示	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1 シリンジ	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1 シリンジ	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1 シリンジ	補)ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ10mL(ヘパリンロック) 1 シリンジ	
	不穏が有る場合	◇【液】リスパダール内用液 1mg/ml[1ml包] 1本	◇【液】リスパダール内用液 1mg/ml[1ml包] 1本	◇【液】リスパダール内用液 1mg/ml[1ml包] 1本	◇【液】リスパダール内用液1mg/ml[1ml包] 1本	