

急性心筋梗塞治療12日間

2019/5/24 13:42

パス日数 12日間	適応基準	除外条件	目標
	急性心筋梗塞にて冠動脈形成術を実施	心不全、肺炎合併 メカニカルサポート時	独歩自宅退院

日付 ユニット名		第1病日 入院当日術後	第2病日 術後1日目	第3病日 2日目	第4病日 3日目	第5病日 4日目	第6病日 5日目	第7病日 6日目	第8病日 7日目	第9病日 8日目	第10病日 9日目	第11病日 10日目	第12病日 11日目	
アウトカム	患者状態	穿刺部に問題がない 循環動態が安定している	穿刺部に問題がない 循環動態が安定している	穿刺部に問題がない 循環動態が安定している	穿刺部に問題がない 循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している	循環動態が安定している 退院基準(独歩自宅療養可能)を満たす	
	生活動作			立位ができる		病棟内の歩行が自由である		シャワー浴できる			リハビリができている			
	知識・教育	今後の治療について理解できる										退院後の生活管理について理解できる		
サマリ文書		入院診療計画書(B様式)												
		ベッドネーム												
		栄養スクリーニング												
		褥瘡予防対策診療計画書												
		転倒・転落アセスメントシート												
治療	処方			◇バイアスピリン錠100mg 1錠										
	注射	[F]ソリュゲンF注500[500mL/本](グイーンF) 1本	[F]ソリュゲンF注500[500mL/本](グイーンF) 1本	[F]ソリュゲンF注500[500mL/本](グイーンF) 1本										
		[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1パック	[キット]セファゾリン注バッグ1g(セファジンα) 1パック	◆[1万]ヘパリンナトリウム注[10000U/10mL] 2 V										
		ニコランジル注48[48mg/√](シグマート) 1 V	ニコランジル注48[48mg/√](シグマート) 1 V											
		◆[1万]ヘパリンナトリウム注[10000U/10mL] 2 V	◆[1万]ヘパリンナトリウム注[10000U/10mL] 2 V											
	汎用	TRバンド減圧時に出血腫脹あった場合は元の量のAir入れて主治医call	端座位負荷施行	立位足踏み施行	安静度:室内フリー	安静度:病棟内フリー			患者区分(移動):自力歩行					
		安静度:ベッド30	安静度:ベッドフリー	排泄:ポータブルトイレ可		心リハの目的について指導		心疾患とこころの関係について指導	禁煙について指導	日常生活について指導	日常生活について指導	口腔と心臓の関係について指導	退院後栄養指導予約確認	
		経口摂取:飲水のみ可		患者区分(移動):車椅子(介助)										
		患者区分(移動):ストレッチャー	経口摂取:経口摂取可	尿測:不要										
		心電図モニター	心電図モニター						清潔:シャワー浴可					
		肺塞栓予防:不要	肺塞栓予防:不要											
		尿測:連日	尿測:連日	体重測定:連日										
		排泄:留置カテーテル	排泄:留置カテーテル											
		清潔:介助清拭		清潔:介助清拭										
		水分制限の有無確認	CKピーク越えたら食事開始											
リハ				心大血管 I 理学										
検査	検体検査	血液検査 他	血液検査 他	血液検査 他		血液検査 他				○ LDL-C(計算)				
		血液検査 他	一般検査 他											
	画像・生理	標準12誘導心電図	P. 胸部 正面(坐位)	標準12誘導心電図	運動負荷心電図(歩行)50m	ABI/CAVI	運動負荷心電図(歩行)200m	胸部 正面(立位)		標準12誘導心電図				
		標準12誘導心電図	標準12誘導心電図	P. 胸部 正面(坐位)	運動負荷心電図(歩行)200m	運動負荷心電図(歩行)200m	運動負荷心電図(歩行)500m		【予】心臓超音波					
栄養	朝		欠食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食		
	昼	欠食		心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食		
	夜	欠食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食	心臓食		
看護ケア	睡眠	睡眠状態 毎日 1回	睡眠状態 毎日 1回											
	与薬の援助	内服確認 毎日 1回	内服確認 毎日 1回											
		体温(℃) 毎日 4回	体温(℃) 毎日 3回											
		脈拍数 毎日 4回	脈拍数 毎日 3回											
		収縮期血圧 毎日 4回	収縮期血圧 毎日 3回											
		拡張期血圧 毎日 4回	拡張期血圧 毎日 3回											
	ケア		食事摂取量(主) 毎日 3回											
			食事摂取量(副) 毎日 3回											
			排便回数 毎日 1回											
	測定	排便回数 毎日 1回	体重(kg) 毎日 1回											
		身長(cm) 毎日 1回												
	OUT	前腕末梢径 毎日 0回												
		SPO2 毎日 4回							SPO2 毎日 3回					
	観察	尿量 毎日 2回	尿量 毎日 3回	尿量 毎日 2回										
		疼痛(胸部) 毎日 4回	疼痛(胸部) 毎日 3回											
		穿刺部疼痛 毎日 4回	穿刺部疼痛 毎日 3回											
		呼吸困難感 毎日 4回	呼吸困難感 毎日 3回											
		動悸 毎日 4回	動悸 毎日 3回											
		右橈骨動脈触知 毎日 4回	右橈骨動脈触知 毎日 3回											
		左橈骨動脈触知 毎日 4回	左橈骨動脈触知 毎日 3回											
	清潔の援助	穿刺部出血 毎日 4回	穿刺部出血 毎日 3回											
		穿刺部腫脹 毎日 4回	穿刺部腫脹 毎日 3回											
		陰部洗浄 毎日 1回	陰部洗浄 毎日 1回											
病床環境整備	洗面介助 毎日 1回	洗面介助 毎日 1回												
	口腔ケア 毎日 1回	口腔ケア 毎日 1回												
指導	シーツ交換 毎日 1回	シーツ交換 7日おき 1回												
	環境整備 毎日 1回	環境整備 毎日 1回												
説明											服薬指導 毎日 1回			
											退院指導 毎日 1回			
	入院時オリエンテーション 毎日 1回													
必要時	熱が37.5度以上になった場合							カロナール錠200 2錠						
	不穏が有る場合							◇ハロヘリドール注5[5mg/1mL](リトン)(セレネース) 1 A						
								◇ハロヘリドール注5[5mg/1mL](リトン)(セレネース) 1 A						
								◇【液】リスヘリドン内用液(1mL包) 1本						
不眠の有る場合							フロチラム錠0.25mg(レントルミン) 1錠							
							【5】ゾルピデム錠5mg(マイスリー) 1錠							
							ベルソムラ錠15mg 1錠							
吐き気または気分不良時							メクログラミド注10[10mg/2mL](フリンヘラン) 1 A							
便秘の場合	低血糖70mg/dlあるいは低血糖症状があるとき						50%ブドウ糖20[50%/20mL] 2本							
							センノシド錠12mg(フルセニド) 2錠							
							【60】クリセリン浣腸液50% 60mL 1個							
疼痛全般 胸痛が有る場合							ヒコスルファート内用液0.75% 10mL/本(ラキパロン) 1本							
							カロナール錠200 2錠							
							ニトロヘン舌下錠0.3mg(分割不可) 1錠→医師call							